联合国
毒品和犯罪问题办公室

吸毒易导致感染艾滋病毒/艾滋病。

不吸毒.
不注射毒品.
不与他人共用针头.

www.unodc.org/thinkaids

概况

- 全球注射吸毒者约有1,600万人，其中可能有五分之一呈艾滋病毒阳性。
- 共用不洁针头和针管是最快和最易感染和传播艾滋病毒的途径之一。

青少年

- 2007年新发艾滋病毒感染270万例，平均每天约7,400例，有200万人因艾滋病毒而死亡。
- 全球新发艾滋病毒感染者中，15-24岁的青少年约占45%。
- 许多青少年仍对如何避免感染艾滋病毒缺乏正确了解。

东欧和中亚

- 新报告艾滋病毒感染病例增加，注射吸毒者、性工作者及其各自的性伴侣为主要发病人群。
- 不洁注射器具是本区域艾滋病毒传播的主要方式，占所有艾滋病毒感染病例的80%以上。
- 本区域新报告的艾滋病毒感染病例中，有近90%发生在俄罗斯联邦和乌克兰。

08-58031_factsheet_chinese.indd 1 2008/11/27 20:35:03

联合国
毒品和犯罪问题办公室

吸毒易导致感染艾滋病毒/艾滋病。

南亚、东亚和东南亚

- 艾滋病毒主要通过注射吸毒传播，而共用针管是本区域注射吸毒者中的常见做法。
- 许多国家注射吸毒者中的艾滋病毒感染率都非常高。
- 在中国，不安全的注射吸毒、无保护商业性行为和其他风险因素相互交织，助长了艾滋病毒的蔓延。
- 在印度，最近调查显示，注射吸毒者中的艾滋病毒传播率正在上升。
- 在巴基斯坦，注射吸毒者人数自2000年以来翻了将近一番，研究表明这一人群的艾滋病毒流行率仍在迅速攀升。

北美洲

- 在美国，每五个新诊断为感染艾滋病毒的妇女当中，约有一个是不安全的注射吸毒所致（美国疾病控制和预防中心，2007年）。
- 在加拿大，约有40%的女性注射吸毒者存在卖淫行为，不安全性行为的普遍程度令人震惊（加拿大健康署，2004年）。

西欧和中欧

- 在西欧，6%的新发艾滋病毒感染病例是由不安全的注射吸毒造成的。
- 在一些国家，不安全的注射吸毒仍然是最常见的艾滋病毒传播方式。
- 本区域注射吸毒者中新发艾滋病毒感染病例呈下降或稳定趋势，这是大多数国家实行了减害政策和方案的缘故。

拉丁美洲

- 拉丁美洲艾滋病毒感染者中约有三分之一生活在巴西；在该国，艾滋病毒先是向注射吸毒者蔓延，最终祸及普通人群，被感染妇女日渐增多。
- 由于在全国推行了减害方案，巴西报告注射吸毒者中艾滋病毒的流行率正在下降。
- 在墨西哥，2007年注射吸毒者中的艾滋病毒流行率为6%，85%以上的注射吸毒者在接受调查时称曾经使用过未经消毒的注射器具。

除另有说明外，资料来源如下：
- 艾滋病规划署2008年全球艾滋病疫情报告
- 艾滋病规划署2007年艾滋病疫情最新通报
- 艾滋病规划署2007年艾滋病疫情最新通报区域概要 – 拉丁美洲
- Mathers, B. 等人。“Global Epidemiology of Injecting Drug Use and HIV among People Who Inject Drugs: A Systematic Review”, The Lancet 2008, 第372卷。

V.08-58031