



الأمم المتحدة
المكتب المعني بالمخدرات والجريمة



إنَّ تناول المخدرات يمكن أيًّا يؤدي إلى الإصابة بالأيدز أو فيروسه.

قبل أن تبدأ التناول.
قبل أن تحقن المخدر.
قبل أن تتقاسم المحقن.

www.unodc.org/thinkaids



حقائق عامة

- تقاسم الإبر والمحاقن الملوثة هو واحد من أسرع وأسهل السبل لالتقاط الفيروس ونقله.
- من بين الأشخاص الذين يتناولون المخدرات بواسطة الحقن، ويُقدر عددهم على نطاق العالم بنحو ١٦ مليوناً، هناك واحد من خمسة يُرجح أن يكون مصاباً بفيروس الأيدز.

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

- ثمة تصاعد في عدد الإصابات الجديدة بفيروس المبلغ عنها،خصوصاً بين صفوف متناولين المخدرات بواسطة الحقن والمتغلين بالجنس وشركائهم في العلاقة الجنسية.

- إنَّ معدلات الحقن الملوثة هي الواسطة الرئيسية لانتقال الفيروس في المنطقة، إذ تتسَبَّب في ما يزيد على ٨٠ في المائة من مجموعة الإصابات به.

- يبلغ نصيب مواطني الاتحاد الروسي وأوكرانيا من مجموع الإصابات الجديدة بفيروس المبلغ عنها قرابة ٩٠ في المائة.

الشباب

- في عام ٢٠٠٧، كانت هناك ٢,٧ مليون إصابة جديدة بفيروس الأيدز -أي نحو ٤٠٠ إصابة كل يوم - و٢ مليون وفاة بسبب الإصابة بذلك الفيروس.

- تُقدَّر نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٤ سنة بين المصابين الجدد بفيروس الأيدز على نطاق العالم بنحو ٤٥ في المائة.

- لا يزال كثير من الشباب يفتقر إلى معلومات صحيحة عن كيفية تفادي التعرض للإصابة بفيروس.

إنَّ تناول المخدرات يمكن أي يؤدي إلى الإصابة بالأيدز أو فيروسه.

الأمم المتحدة
المكتب المعنى بالمخدرات والجريمة



أوروبا الغربية والوسطى

- في أوروبا الغربية، يُعزى ٦ في المائة من الإصابات الجديدة بالفيروس إلى تناول المخدرات غير المأمون بواسطة الحقن.
- في بعض البلدان، لا يزال تناول المخدرات غير المأمون بواسطة الحقن هو السبيل الأشيع للعدوى بالفيروس.
- يُعزى تناقص أثبات عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بين متناولين المخدرات بواسطة الحقن في المنطقة إلى استحداث سياسات وبرامج لتقليل الأضرار في معظم البلدان.

أمريكا اللاتينية

- يقيم في البرازيل نحو ثلث مجموع المصاين بالفيروس في أمريكا اللاتينية؛ فقد انتشر الفيروس في هذا البلد ليصيب متناولين المخدرات بواسطة الحقن، ثم عامة الناس في نهاية المطاف، مع تزايد أعداد النساء المصاين به.
- نتيجة لبرامج تقليل الأضرار في البرازيل، أفاد هذا البلد عن تناقص نسب انتشار الفيروس بين متناولين المخدرات بواسطة الحقن.
- في المكسيك، بلغت نسبة انتشار الفيروس بين متناولين المخدرات بواسطة الحقن ٦ في المائة عام ٢٠٠٧. وعندما سُئل هؤلاء في أحد الاستقصاءات، قال ٨٥ في المائة منهم إنهم استخدمو أدوات حقن غير معقمة.

جنوب آسيا وشرقها وجنوب شرقها

- كثيراً ما تحدث العدوى بالفيروس عن طريق تناول المخدرات بواسطة الحقن؛ وتقاسم المحققون هو عرف شائع بين متناولين المخدرات بهذه الواسطة في المنطقة.
- ثمة بلدان كثيرة لديها نسب عالية جداً من الإصابات بالفيروس بين متناولين المخدرات بواسطة الحقن.
- في الصين، ثمة تداخل بين تناول المخدرات غير المأمون بواسطة الحقن وممارسة الجنس تجاريًّا دون وقاية وعوامل أخرى ذات مخاطر، مما يزيد من انتشار الإصابة بالفيروس.
- في الهند، تدلُّ الاستقصاءات الأخيرة على تنامي حالات العدوى بالفيروس بين متناولين المخدرات بواسطة الحقن.
- في باكستان، تَضاعَف تقريرياً عدد متناولين المخدرات بواسطة الحقن منذ عام ٢٠٠٠، وتبيّن الدراسات أن انتشار الإصابة بالفيروس بين صفوف هذه الفئة يتزايد بسرعة.

أمريكا الشمالية

- في الولايات المتحدة، يُعزى خمس الإصابات بالفيروس المشخصة حديثاً بين صفوف النساء إلى تناول المخدرات غير المأمون بواسطة الحقن (المصدر: مراكز الولايات المتحدة لمراقبة الأمراض والوقاية منها، ٢٠٠٧).
- في كندا، تبلغ نسبة بائعات الجنس بين النساء اللواتي يتناولن المخدرات بواسطة الحقن زهاء ٤٠ في المائة، كما أن الممارسات الجنسية غير المأمونة شائعة على نحو مثير للزعزع (المصدر: وزارة الصحة الكندية، ٤، ٢٠٠٤).

المصادر، مالم يذكر خلاف ذلك:

- UNAIDS 2008 Report on the Global AIDS Epidemic
- UNAIDS AIDS Epidemic Update 2007
- UNAIDS AIDS Epidemic Update 2007 Regional Summary – Latin America
- Mathers, B. et al. "Global Epidemiology of Injecting Drug Use and HIV among People Who Inject Drugs: A Systematic Review," The Lancet 2008, Volume 372.