UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

El consumo de drogas puede exponerte al VIH/SIDA.

antes de empezar.
antes de inyectarte.
antes de compartir.

www.unodc.org/thinkaids

Datos generales

- Se estima que existen 16 millones de personas que se inyectan drogas en todo el mundo, y es probable que una de cada cinco sea seropositiva.
- Una de las formas más rápidas y fáciles de infectarse con el VIH y transmitirlo es el uso compartido de agujas y jeringuillas contaminadas.

Los jóvenes

- En 2007 hubo 2,7 millones de nuevos casos de infección por el VIH —alrededor de 7.400 por día— y dos millones de muertes relacionadas con el VIH.
- Se estima que un 45% de los nuevos casos de infección por el VIH en todo el mundo afectan a jóvenes de entre 15 y 24 años de edad.
- Muchos jóvenes aún carecen de información precisa sobre la manera de evitar la exposición al virus.

Europa Oriental y Asia Central

- El número de casos de infección por el VIH comunicados recientemente está aumentando, sobre todo entre los consumidores de drogas por inyección, los trabajadores sexuales y sus respectivas parejas sexuales.
- El equipo de inyección contaminado es la principal vía de transmisión del VIH en la región, dando cuenta de más del 80% de todos los casos de infección por el VIH.
- Casi el 90% de todos los casos de infección por el VIH comunicados recientemente en la región corresponden a la Federación de Rusia y a Ucrania.

NACIONES UNIDAS
Oficina contra la Droga y el Delito

El consumo de drogas puede exponerte al VIH/SIDA.

Asia Meridional, Oriental y Sudoriental

- La transmisión del VIH se realiza a menudo por la vía del consumo de drogas por inyección, y el uso compartido de jeringuillas es una práctica común entre los consumidores de drogas por inyección de la región.
- Muchos países tienen índices muy elevados de infección por el VIH entre los consumidores de drogas por inyección.
- En China, una combinación entre el consumo poco seguro de drogas por inyección, las relaciones sexuales sin protección en el marco de la prostitución y otros factores de riesgo está impulsando la difusión del VIH.
- En la India, las encuestas recientes indican que está aumentando la transmisión del VIH entre los consumidores de drogas por inyección.
- En Pakistán, el número de consumidores de drogas por inyección prácticamente se ha duplicado desde 2000, y de los estudios realizados se desprende que la prevalencia del VIH entre esta población está aumentando rápidamente.

América del Norte

- En los Estados Unidos, alrededor de uno de cada cinco casos de infección por el VIH diagnosticados recientemente en mujeres se debe al consumo poco seguro de drogas por inyección (Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, 2007).
- En Canadá, alrededor del 40% de las consumidoras de drogas por inyección también ejercen la prostitución, y las prácticas sexuales poco seguras son de una frecuencia alarmante (Health Canada, 2004).

Europa Occidental y Central

- En Europa occidental, el 6% de todos los nuevos casos de infección por el VIH se deben al consumo poco seguro de drogas por inyección.
- En algunos países el consumo poco seguro de drogas por inyección sigue siendo la vía más frecuente de transmisión del VIH.
- Las tendencias a la reducción o estabilización de nuevos casos de infección por el VIH entre los consumidores de drogas por inyección en la región se deben a la introducción de políticas y programas de reducción del daño en la mayoría de los países.

América Latina

- Alrededor de un tercio de todas las personas que viven con el VIH en América Latina residen en Brasil; en este país el VIH se ha difundido entre los consumidores de drogas por inyección y por último entre la población en general, y está aumentando el número de mujeres que contraen la infección.
- A raíz de los programas de reducción del daño ejecutados en el país, Brasil ha comunicado una reducción en las tasas de prevalencia del VIH entre los consumidores de drogas por inyección.
- En México, la prevalencia del VIH entre los consumidores de drogas por inyección era del 6% en 2007 y, al ser entrevistados, más del 85% de los consumidores de drogas por inyección declararon que habían utilizado equipo para inyecciones no esterilizado.

Fuentes, salvo indicación en contrario:
- Informe sobre la epidemia mundial de VIH/SIDA, 2008, publicado por el ONUSIDA.
- Situación de la epidemia de SIDA, 2007, publicación del ONUSIDA.
- Situación de la epidemia de SIDA, 2007, resumen regional - América Latina, publicación del ONUSIDA.
- Mathers, B., y otros "Global epidemiology of injecting drug Uuse and HIV among people who inject drugs: a systematic review", *The Lancet 2008*, volumen 372.