EINE VERSEUCHTE NADEL IST EIN GRÖßERES RISIKO ALS UNGESCHÜTZTER SEX.

Mehr Informationen im Internet unter:

www.odccp.org
www.unaids.org

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNAIDS
UNICEF • UNDP • UNFPA • UNDCP
UNESCO • WHO • WORLD BANK

UN ODCCP United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention

Drogenmissbrauch und HIV/AIDS = Eine verheerende Kombination

Was ist AIDS?

AIDS ist eine durch HIV verursachte unheilbare Krankheit. Wenn HIV in Ihren Körper eindringt, beginnt es, das Immunsystem anzugreifen, das Ihren Körper vor Erkrankungen schützt. HIV schwächt langsam Ihr Immunsystem, Sie entwickeln zuerst leichte Krankheiten, dann schwerere und schließlich lebensbedrohliche wie Tuberkulose und Lungenentzündung. Diese Endphase der Infektion heißt AIDS.

Können sich nur Homosexuelle und Drogenkonsumenten, die sich Drogen injizieren, mit HIV infizieren?

Nein. Jeder kann sich mit HIV anstecken. Jeder, der ungeschützten Geschlechtsverkehr hat oder Spritzen mit anderen teilt, läuft Gefahr, sich mit HIV/AIDS anzustecken.

Wie bekommt man AIDS?

HIV wird durch ungeschützten geschlechtlichen Kontakt (Geschlechtsverkehr ohne Kondom), infizierte Bluttransfusionen, verseuchte Spritzen (die meist zur Injektion von Drogen verwendet werden) und durch infizierte Mütter während der Schwangerschaft, der Niederkunft und des Stillens übertragen.

Bekommt man HIV, wenn man Drogen nimmt?

Ihr Risiko, sich mit HIV zu infizieren, ist größer, wenn Sie Drogen nehmen. Denken Sie daran: Drogen verändern Ihr Bewußtsein und beeinträchtigen Ihre Urteilsfähigkeit. Sie machen es schwerer, nein zu sagen, und es wird wahrscheinlicher, dass Sie vergessen, ein Kondom zu benützen.

Wie sieht ein HIV-Infizierter aus?

HIV-Träger erkennt man nicht. Ein HIV-Infizierter kann krank aussehen, oder auch nicht. HIV-Infizierte können sich lange Zeit gesund fühlen und das Virus Monate, sogar Jahre lang in sich tragen, bevor sie krank werden. Diese ganze Zeit hindurch können sie unbewusst andere anstecken, wenn sie ungeschützten Geschlechtsverkehr haben oder gemeinsam mit anderen Spritzen benützen.

Wie weiß man, ob man HIV hat?

Sie können zum Arzt gehen und einen HIV-Test machen. Der Test sagt Ihnen, ob sie das Virus in Ihrem Körper haben.

Wie verhindert man, dass man sich mit HIV ansteckt?

Schützen Sie sich mit einem Kondom, teilen Sie keine Spritzen mit anderen und halten Sie Ihr Leben unter Kontrolle - nehmen Sie keine Drogen.

Was kann man tun, wenn man HIV hat?

Sprechen Sie mit Ärzten und Sozialberatern über medizinische Betreuung und andere Hilfe in Ihrer Umgebung. Selbst wenn teure neue Therapien nicht verfügbar sind, um den Ausbruch von AIDS hinauszuzögern, sollten Sie Medikamente erhalten können, um Ihre Infektionen zu behandeln und zu mildern, sowie psychologische Beratung und soziale Unterstützung.