UNA AGUJA CONTAMINADA CREA UN MAYOR RIESGO DE INFECCIÓN AÚN MAYOR QUE LAS RELACIONES SEXUALES SIN LA DEBIDA PROTECCIÓN.

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
ONUSIDA
UNICEF • PNUD • FNUAP • PNUFID
UNESCO • OMS • BANCO MUNDIAL

Para más información, visita nuestros sitios en la Web:

www.odccp.org
www.unaids.org

UN ODCCP
Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito

El uso indebido de drogas y el VIH/SIDA = una combinación devastadora

¿Qué es el SIDA?

El SIDA es una enfermedad incurable causada por un virus llamado VIH. Cuando el VIH entra en el cuerpo, empieza a atacar tu sistema inmunitario, que normalmente protege tu cuerpo contra las enfermedades. Con el tiempo, el VIH debilitará lentamente tu sistema inmunitario y contraerás primero afecciones leves, luego enfermedades graves y, por último, algunas que pondrán en peligro tu vida, como la tuberculosis y la neumonía. Esta es la etapa final de la infección que los médicos llaman SIDA.

¿Sólo los homosexuales y los consumidores de drogas contraen el SIDA?

No. Cualquiera puede infectarse con el VIH. Cualquiera que tenga relaciones sexuales sin protección o comparta las agujas de otros corre el riesgo de contraer el VIH/SIDA.

¿Cómo se contrae el VIH?

El VIH se propaga en las relaciones sexuales sin protección (sin usar condón), por la transfusión de sangre infectada, mediante la utilización de agujas contaminadas (utilizadas muy frecuentemente para inyectarse drogas) y por el contagio de una madre infectada a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

¿Se contrae el VIH por consumir drogas?

Si consumes drogas corres un mayor riesgo de contraer el VIH. Piénsalo: las drogas te alteran las facultades mentales y afectan tu capacidad de juicio, con lo cual te resultará más difícil decir "no" y será más probable que te olvides de utilizar el condón.

¿Qué aspecto tiene la persona infectada por el VIH?

No es posible distinguir a quienes tienen el virus. La persona infectada por el VIH puede tener o no aspecto de enferma. Los infectados por el virus se pueden sentir sanos por mucho tiempo y ser portadores del virus durante meses o años antes de enfermarse. Sin embargo, durante todo ese tiempo pueden infectar, sin saberlo, a otros si tienen relaciones sexuales sin protección o comparten agujas para inyectarse.

¿Cómo se sabe que se ha contraído el VIH?

Puedes acudir a un médico para hacerte una prueba del VIH/SIDA. Esa prueba te permitirá saber si eres portador del virus.

¿Cómo se puede evitar el contagio del VIH?

Protégete utilizando un condón, no compartas agujas y sé dueño de tu propia vida: no consumas drogas.

¿Qué puedes hacer si has contraído el VIH?

Habla con los médicos y otros profesionales de la salud sobre las posibilidades de atención médica y otras ayudas que ofrece la comunidad. Aunque no se disponga de las nuevas terapias de alto costo para retrasar el comienzo de la enfermedad, podrás obtener medicamentos para tratar y aliviar tus infecciones y también podrás recibir apoyo sicológico y social.